

Advertencias Sobre el Consumo de Pescado en Maryland

para peces capturados recreacionalmente en St. Mary's County, MD

Directiva sobre Especie de peces capturados recreacionalmente en aguas dulces, estuarinas y marinas de Maryland

Tamaño de comida recomendado: 8 oz o 9 cangrejos - Población general y mujeres; 3 oz o 4 cangrejos - Niños

Nota: Las recomendaciones de consumo se basan en el espaciado de las comidas para evitar niveles elevados de exposición, pescado contaminado con Bifenilos Policlorados (PCBs) SOLO se puede retirar la carne lateral para permitir más comidas por mes

1 Mujeres = mujeres en edad fértil (mujeres que están embarazadas o pueden quedar embarazadas, o están amamantando)

2 Niños = Niños menores de 6 años

♥ = El pescado contiene más de 1 g de ácidos grasos esenciales en un filete del tamaño de dos barajas de cartas

◇ = Pescado al que se le ha eliminado toda la carne oscura y/o grasa abdominal, lo que conduce a una reducción de la contaminación por PCB

Contaminante presente en pescado: * Mercurio Δ Bifenilos Policlorados (PCBs) + Pesticidas ◇ PFOS

Especie	Cuerpo de Agua	Comidas recomendadas/mes		
		Población General	Mujeres 1	Niños 2
corvina de línea o labrada (Micropogonias undulatus)	Bahía de Chesapeake Inferior y Afluentes Δ	4	4	4
anguila americana (Anguilla rostrata)	Río Patuxent inferior Δ	3	3	3
Cabrilla negra / serrano estriado (Centropristis striata)	Bahía de Chesapeake Inferior y Afluentes ◇	2	2	1
Bagre Azul (Ictalurus furcatus)	Río Patuxent inferior 15" - 24" Δ	3	3	1
	Potomac: Boca a 301 12" - 15" Δ	4	4	4
	15" - 24" Δ	2	2	1
	24" - 30" Δ	1	1	1 cada otro mes
	> 30" Δ	Evite	Evite	Evite
	> 30" Δ ◇	2	2	1
cangrejo azul (Callinectes sapidus)	Río Back, río Middle o río Patapsco, incluido el puerto de Δ	6	6	5
	Otras Areas de la Bahía Δ	sin límite	sin límite	sin límite
hepatopáncreas ("mostaza") de el cangrejo azul (Callinectes sapidus)	Río Back, río Middle o río Patapsco, incluido el puerto de Baltimore Δ	Evite	Evite	Evite
	Otras Areas de la Bahía Δ	Comer con moderación	Comer con moderación	Comer con moderación
bagre de canal (Ictalurus punctatus)	Río Patuxent inferior Δ	2	2	1
perca atruchada/americana/negra (Micropterus salmoides) y Lobina de boca pequeña (Micropterus dolomieu) ♥	Río Patuxent inferior Δ	sin límite	sin límite	sin límite
	Río de St. Mary Δ	2	1	1 cada otro mes
cabeza de serpiente (Channa argus)	Río Patuxent inferior *	sin límite	sin límite	5
trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y trucha arcoiris dorada (criados en criadero)	peces de criadero almacenados en Anne Arundel County, Allegany County, Baltimore City, Baltimore County, Calvert County, Carroll County, Caroline County, Cecil County, Charles County, Frederick County, Garrett County, Harford County, Howard County, Queen Anne's County, Montgomery County, Prince George's County, Washington County, Wicomico County, y Worcester County Δ	sin límite	sin límite	sin límite
	**Para obtener más información sobre los peces de siembra y cosecha, consulte https://www.eregulations.com/maryland/fishing/put-and-take-trout-fishing-areas **Para obtener más información sobre las Áreas de Manejo Especial - Trucha, consulte https://www.eregulations.com/maryland/fishing/special-management-areas-trout			
Trompetero Plateado de Murray (Bidyanus bidyanus)	Río de St. Mary ◇	7	6	3
Corvinata rubia, corvinata de mancha, croca (Leiostomus xanthurus) ♥	Bahía de Chesapeake Inferior y Afluentes ◇	3	3	2
	Río Patuxent inferior Δ	sin límite	sin límite	sin límite
	Potomac: Boca a 301 Δ	5	5	4
	Río de St. Mary Δ	5	5	4
lubina rayada atlántica (Morone saxatilis) ♥	Bahía de Chesapeake Inferior y Afluentes < 28" Δ ◇	sin límite	sin límite	7
	< 28" Δ	3	3	2
	> 28" Δ ◇	sin límite	sin límite	5
	> 28" Δ	1	1	1 cada otro mes
Centráquidos (incluyendo mojarra oreja azul (Lepomis macrochirus))	Río Patuxent inferior Δ	sin límite	sin límite	7
	Río Potomac: Boca a 301 ◇	1	1 cada otro mes	1 cada otro mes
perca blanca (Morone americana)	Potomac: Boca a 301 Δ	6	6	6
bagre torito amarillo (Ameiurus natalis)	Río Patuxent inferior Δ	5	5	4